



## ANTES DE LA CIRUGIA

Debe comunicar a su dentista los tratamientos médicos y quirúrgicos realizados con anterioridad o si está siendo tratado en la actualidad por algún proceso, con el fin de valorar si esto puede influir en la evolución de la intervención.

- También debe informar de la existencia de:
  - Reacciones adversas a los medicamentos.
  - Alergias (látex, yodo, anestésicos...)
  - Posibles enfermedades infecciosas.
  - Factores de riesgo (diabetes, hipertensión, cardiopatías, osteoporosis, reuma, hepatopatías, insuficiencia renal...)
  - Tratamiento con anticoagulantes orales o aspirina diaria.
  - Embarazo.
- Los pacientes en tratamiento con anticoagulantes (por ejemplo, SINTROM®) pueden ser tratados en la consulta dental. El cardiólogo les prescribe una pauta, para limitar el riesgo de hemorragia.
- No debe tomar aspirina (ácido acetilsalicílico) los 7-10 días previos a la cirugía, pues aumenta el riesgo de hemorragia.
- Si ha sufrido un infarto de miocardio reciente se debe posponer la cirugía 6 meses.
- Si está embarazada:
  - La cirugía oral se debe aplazar hasta 6 semanas después del parto.
  - Las urgencias se pueden tratar una vez finalizado el primer trimestre, que es cuando se han formado los órganos del bebé.
  - Si es muy urgente (traumatismo, infección) se atiende cuidadosamente, minimizando los riesgos, en cualquier momento del embarazo, aunque no es lo ideal.
- Si es diabético:
  - No acuda a la intervención en ayunas.
  - Siga con su dosis habitual de insulina.
  - Controle su nivel de glucosa en sangre.
  - El control de la glucemia, de la infección y la prescripción de antibióticos lo debe valorar su médico antes de la cirugía.
- Recomendaciones generales antes de la cirugía:
  - Extremar las medidas de higiene bucal.

<http://www.clinicadentalaranda.com>

Avda. Aeropuerto, 42 - 14004 CÓRDOBA (España)

Telef. 957 231 236 - [info@clinicadentalaranda.com](mailto:info@clinicadentalaranda.com)



**Dra. Isabel Aranda Valdivia**  
Odontóloga - Col. 1835

- Tomar correctamente la medicación prescrita.
- Se aconseja acudir acompañado para su comodidad.
- No es necesario que esté en ayuno.
- Se recomienda hacer una comida ligera 2 ó 3 horas antes de la intervención
- No olvide traer los documentos que guarda usted: radiografías, analítica reciente...

<http://www.clinicadentalaranda.com>

Avda. Aeropuerto, 42 - 14004 CÓRDOBA (España)

Telef. 957 231 236 - [info@clinicadentalaranda.com](mailto:info@clinicadentalaranda.com)